

VOTRE TRAITEMENT PAR MÉDICAMENTS À RISQUE : CE QU'IL FAUT SAVOIR



Des traitements essentiels
mais à manipuler avec
précaution.



Certains médicaments présentent des risques accrus en raison de leurs effets secondaires potentiels ou de leur marge thérapeutique étroite. Pour garantir leur bonne utilisation et sécurisation à domicile, des mesures spécifiques sont mises en place.

Médicaments à risque concernés :

- Morphiniques et opiacés (Morphine, Oxycodone, Fentanyl, Tramadol, Codéine)
- Midazolam
- Chlorure de potassium injectable
- Kétamine
- Insuline
- Antivitamines K (AVK)

Sécurisation des médicaments à risque :

- Les médicaments sensibles (morphiniques, midazolam, kétamine, chlorure de potassium) sont conservés dans des mallettes à code, limitant l'accès aux seules personnes autorisées (soignants et patients formés).
- Veillez à toujours refermer la mallette après utilisation et à ne pas divulguer le code d'accès.

Stockage à domicile :

- Médicaments à température ambiante : Conserver les morphiniques, midazolam et AVK dans un endroit sec et sûr.
- Insuline et produits réfrigérés : L'insuline en cours d'utilisation peut être conservée à température ambiante (< 25°C). Le stock doit être placé au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
- Système de pastilles rouges : Pour repérer rapidement l'insuline stockée au réfrigérateur, une pastille rouge est apposée sur l'emballage.

Besoin d'informations ? Contactez votre équipe HAD ou votre pharmacien en cas de doute.

Une question sur votre traitement ? Demandez conseil à votre médecin.

Précautions et bonnes pratiques :

Respect strict de la prescription médicale

- Ne modifiez jamais la dose ou la fréquence d'administration sans l'avis de votre médecin.
- Pour l'insuline, respectez les sites d'injection recommandés et faites un suivi glycémique régulier.

Identification et traçabilité

- Notez chaque administration dans votre carnet de suivi.
- Informez les soignants en cas de problème ou d'oubli de dose.

Prévention des risques

- Médicaments sédatifs (morphiniques, midazolam, kétamine) : Risque de somnolence, confusion et dépression respiratoire.
- Chlorure de potassium : Risque cardiaque en cas de mauvaise administration.
- Insuline : Risque d'hypoglycémie
- AVK : Risque de saignements.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- ▲ Ne jamais partager votre traitement avec une autre personne.
- ▲ Ne pas arrêter brutalement un traitement sans avis médical.
- ▲ Ne pas stocker les médicaments à la portée des enfants ou des visiteurs.
- ▲ Ne pas laisser les médicaments exposés à la chaleur ou à l'humidité.